

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura - **Decreto dirigenziale n. 133 del 15 aprile 2009 – D.G.R. n. 617 del 27.3.2009 - Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI) - Integrazione de "Le norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture - aggiornamento gennaio 2009" (DRD n. 29 del 5.03.09 e DRD n. 40 del 13.03.09)**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con DRD n. 29 del 5.03.09 e DRD n. 40 del 13.03.09 sono state approvate "Le norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture - aggiornamento gennaio 2009" redatte dal Se.S.I.R.C.A per l'anno 2009 cui devono attenersi tutti coloro che aderiscono al PRLFI ed alle misure agroambientali del PSR della Regione Campania (Reg. CE 1257/99 e Reg. 1698/05);

CONSIDERATO che tali Norme Tecniche hanno ricevuto il parere di conformità alle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata da parte del Comitato Produzione Integrata istituito presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con DM n. 242/st del 31.01.05;

CONSIDERATO che con nota n. 002274 del 10.04.08 il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato che nella seduta del 17 marzo 2009 il Comitato Produzione Integrata ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida Nazionali sulla base di nuovi principi attivi registrati o esclusi dal registro nazionale. Alle singole Amministrazioni è stata riconosciuta pertanto la possibilità di aggiornare i propri disciplinari, qualora lo ritenessero opportuno e senza ulteriore ratifica, sulla base delle novità intervenute ed in conformità alle Linee Guida Nazionali vigenti;

VISTA la nota Mipaaf n. 0008980 del 9.04.09 con cui si autorizzano le Regioni Piemonte, Campania e Lazio ad inserire il p.a. endosulfan nella difesa del nocciolo, in applicazione dell'art. 8 del Decreto Legislativo 194/95;

RITENUTO pertanto di poter integrare le "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture- aggiornamento gennaio 2009", approvate con DRD n. 29 del 5.03.2009 e DRD n. 40 del 13.03.09, secondo la tabella di seguito riportata, fermo restando quant'altro in esse contenuto. Tali modifiche entrano in vigore a far data dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURC:

PAG.	COLTURA	AVVERSITA'	P.A. DA INTRO-DURRE	NOTE
12	vite	peronospora	mandipropamide	Al massimo 3 trattamenti annui. Non più di 2 trattamenti annui se impiegato con mancozeb.
13	vite	oidio	ciproconazolo	Al massimo 3 trattamenti annui con IBE
32	nocciolo	balanino	endosulfan	Al massimo 1 trattamento annuo nel periodo 31 marzo – 28 luglio; solo formulati Xi
33	nocciolo	cimici	endosulfan	Al massimo 1 trattamento annuo nel periodo 31 marzo – 28 luglio; solo formulati Xi
44	albicocco	oidio	ciproconazolo	Al massimo 2 trattamenti annui con IBE
46	fragola	oidio	meptildinocap	Al massimo 2 trattamenti annui
53	melo	oidio	ciproconazolo	Al massimo 4 trattamenti annui con IBE
53	melo	oidio	Pyraclostrobin+boscalid	Con le strobilurine al massimo tre trattamenti annui

PAG.	COLTURA	AVVERSITA'	P.A. DA INTRO- DURRE	NOTE
60	pero	ticchiolatura	Pyraclostrobin+ boscalid	Con le strobilurine al massimo tre trat- tamenti annui
68	pesco	oidio	ciproconazolo	con IBE al massimo 3 trattamenti annui per le varietà a maturazione precoce 4 per le tardive
77	asparago	ruggine	ciproconazolo	Al massimo 2 trattamenti annui con IBE indipendentemente dall'avversità
82	carciofo	oidio	ciproconazolo	Al massimo 1 trattamento annuo con IBE indipendentemente dall'avversità
98	cetriolo	peronospora	flupicolide	Al massimo 2 trattamenti annui
98	cetriolo	oidio	meptildinocap	Al massimo 2 trattamenti annui
104	zucchini	peronospora	mandipropamide	Al massimo 2 trattamenti annui solo pie- no campo
104	zucchini	oidio	meptildinocap	Al massimo 2 trattamenti annui
122	finocchio	rizottoniosi	<i>Trichoderma spp.</i>	
125	lattuga	peronospora	mandipropamide	Al massimo 1 trattamento per ciclo in pieno campo e max 1 in serra; in alterna- tiva all'iprovalicarb
126	lattuga	afidi	lambdacialotrina	Al massimo 1 trattamento per ciclo coltu- rale con i piretroidi; solo pieno campo
126	lattuga	notte	lambdacialotrina	Al massimo 1 trattamento per ciclo coltu- rale con i piretroidi; solo pieno campo
128	Indivia riccia	Marciume del colletto	Pyraclostrobin+ boscalid	Al massimo 2 trattamenti annui tra azo- xystrobin e pyraclostrobin
129	Indivia riccia	Afidi	lambdacialotrina	Al massimo 1 trattamento per ciclo coltu- rale con i piretroidi; solo pieno campo
129	Indivia riccia	notte	lambdacialotrina	Al massimo 1 trattamento per ciclo coltu- rale con i piretroidi; solo pieno campo
131	indivia scarola	peronospora	mandipropamide	Al massimo 2 trattamenti per ciclo in pieno campo e max 1 in serra
131	indivia scarola	Marciume del colletto	Pyraclostrobin+ boscalid	Al massimo 2 trattamenti annui tra azo- xystrobin e pyraclostrobin
132	indivia scarola	afidi	lambdacialotrina	Al massimo 1 trattamento per ciclo coltu- rale con i piretroidi; solo pieno campo
133	indivia scarola	notte	lambdacialotrina	Al massimo 1 trattamento per ciclo coltu- rale con i piretroidi; solo pieno campo
142	melone	peronospora	mandipropamide	Al massimo 2 trattamenti all'anno
142	melone	oidio	meptildinocap	Al massimo 2 trattamenti all'anno
149	cocomero	oidio	meptildinocap	Al massimo 2 trattamenti all'anno
156	patata	peronospora	mandipropamide	Al massimo 3 trattamenti annui. Non più di 2 trattamenti se impiegato con man- cozeb.
156	patata	peronospora	flupicolide	Al massimo 3 trattamenti all'anno
158	patata	elateridi	Concia dei tuberi seme	

PAG.	COLTURA	AVVERSITA'	P.A. DA INTRO-DURRE	NOTE
167	pisello	oidio	ciproconazolo	Al massimo 2 trattamenti all'anno
169	pomodoro coltura protet- ta	peronospora	mandipropamide	Al massimo 3 trattamenti annui. Non più di 2 trattamenti se impiegato con man- cozeb.
169	pomodoro coltura protet- ta	peronospora	flupicolide	Al massimo 3 trattamenti all'anno
169	pomodoro coltura protet- ta	peronospora	dimetomorf	Al massimo 3 trattamenti all'anno
178	basilico	marciumi molli radicali e basali	<i>Trichoderma spp.</i>	Autorizzato solo su <i>Pythium</i>
182	prezzemolo	rizottoniosi	<i>Trichoderma spp.</i>	
183	rucola pieno campo	peronospora	mandipropamide	Al massimo 2 trattamenti per ciclo col- turale
184	rucola pieno campo	sclerotinia	Pyraclostrobin + boscalid	Al massimo 2 trattamenti per ciclo col- turale
187	sedano	rizottoniosi	<i>Trichoderma spp</i>	
192	lattughino IV gamma	peronospora	mandipropamide	Al massimo 1 trattamenti per ciclo col- turale, al massimo 4 all'anno
198	dolcetta IV gamma	rizottoniosi	<i>Trichoderma spp</i>	
203	cicorino IV gamma	moria delle piantine	<i>Trichoderma spp</i>	
207	foglie e steli di brassica IV gamma	Rizoctonia e pythium	<i>Trichoderma spp</i>	
210	bietola IV gamma	Moria delle piantine	<i>Trichoderma spp</i>	
213	spinacino IV gamma	rizoctonia	<i>Trichoderma spp</i>	
216	rucola coltura protetta	peronospora	mandipropamide	Al massimo 1 trattamenti per ciclo col- turale, al massimo 4 all'anno
221	barbabietola	elateridi	Concia dei semi	
225	pomodoro pieno campo	peronospora	mandipropamide	Al massimo 3 trattamenti annui. Non più di 2 trattamenti se impiegato con man- cozeb.
225	pomodoro pieno campo	peronospora	flupicolide	Al massimo 3 trattamenti all'anno
227	pomodoro pieno campo	oidio	ciproconazolo	Al massimo 3 trattamenti annui con IBE indipendent. dall'avversità
302	fagiolino	pendimetalin		Diserbo pre-emergenza 2,5 l; 38,72%
306	lattuga	pendimetalin		Diserbo pre-emergenza 2,5l; 38,72%
307	indivia riccia	pendimetalin		Diserbo pre-emergenza 2,5l; 38,72%
308	indivia scarola	pendimetalin		Diserbo pre-emergenza 2,5l; 38,72%

Alla stregua dell'Istruttoria compiuta dal Servizio 03

DECRETA

per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa che s'intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

- di integrare le "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture- aggiornamento gennaio 2009", approvate con DRD n. 29 del 5.03.2009 e DRD n. 40 del 13.03.09, secondo la tabella di seguito riportata, fermo restando quant'altro in esse contenuto. Tali modifiche entrano in vigore a far data dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURC.

PAG.	COLTURA	AVVERSITA'	P.A. DA INTRO-DURRE	NOTE
12	vite	peronospora	mandipropamide	Al massimo 3 trattamenti annui. Non più di 2 trattamenti annui se impiegato con mancozeb.
13	vite	oidio	ciproconazolo	Al massimo 3 trattamenti annui con IBE
32	nocciolo	balanino	endosulfan	Al massimo 1 trattamento annuo nel periodo 31 marzo – 28 luglio; solo formulati Xi
33	nocciolo	cimici	endosulfan	Al massimo 1 trattamento annuo nel periodo 31 marzo – 28 luglio; solo formulati Xi
44	albicocco	oidio	ciproconazolo	Al massimo 2 trattamenti annui con IBE
46	fragola	oidio	meptildinocap	Al massimo 2 trattamenti annui
53	melo	oidio	ciproconazolo	Al massimo 4 trattamenti annui con IBE
53	melo	oidio	Pyraclostrobin+boscalid	Con le strobilurine al massimo tre trattamenti annui
60	pero	ticchiolatura	Pyraclostrobin+boscalid	Con le strobilurine al massimo tre trattamenti annui
68	pesco	oidio	ciproconazolo	con IBE al massimo 3 trattamenti annui per le varietà a maturazione precoce 4 per le tardive
77	asparago	ruggine	ciproconazolo	Al massimo 2 trattamenti annui con IBE indipendentemente dall'avversità
82	carciofo	oidio	ciproconazolo	Al massimo 1 trattamento annuo con IBE indipendentemente dall'avversità
98	cetriolo	peronospora	flupicolide	Al massimo 2 trattamenti annui
98	cetriolo	oidio	meptildinocap	Al massimo 2 trattamenti annui
104	zucchini	peronospora	mandipropamide	Al massimo 2 trattamenti annui solo pieno campo
104	zucchini	oidio	meptildinocap	Al massimo 2 trattamenti annui
122	finocchio	rizottoniosi	<i>Trichoderma spp.</i>	
125	lattuga	peronospora	mandipropamide	Al massimo 1 trattamento per ciclo in pieno campo e max 1 in serra; in alternativa all'iprovalicarb

PAG.	COLTURA	AVVERSITA'	P.A. DA INTRO-DURRE	NOTE
126	lattuga	afidi	lambdacialotrina	Al massimo 1 trattamento per ciclo colturale con i piretroidi; solo pieno campo
126	lattuga	nottue	lambdacialotrina	Al massimo 1 trattamento per ciclo colturale con i piretroidi; solo pieno campo
128	Indivia riccia	Marciume del colletto	Pyraclostrobin+boscalid	Al massimo 2 trattamenti annui tra azoxystrobin e pyraclostrobin
129	Indivia riccia	Afidi	lambdacialotrina	Al massimo 1 trattamento per ciclo colturale con i piretroidi; solo pieno campo
129	Indivia riccia	nottue	lambdacialotrina	Al massimo 1 trattamento per ciclo colturale con i piretroidi; solo pieno campo
131	indivia scarola	peronospora	mandipropamide	Al massimo 2 trattamenti per ciclo in pieno campo e max 1 in serra
131	indivia scarola	Marciume del colletto	Pyraclostrobin+boscalid	Al massimo 2 trattamenti annui tra azoxystrobin e pyraclostrobin
132	indivia scarola	afidi	lambdacialotrina	Al massimo 1 trattamento per ciclo colturale con i piretroidi; solo pieno campo
133	indivia scarola	nottue	lambdacialotrina	Al massimo 1 trattamento per ciclo colturale con i piretroidi; solo pieno campo
142	melone	peronospora	mandipropamide	Al massimo 2 trattamenti all'anno
142	melone	oidio	meptildinocap	Al massimo 2 trattamenti all'anno
149	cocomero	oidio	meptildinocap	Al massimo 2 trattamenti all'anno
156	patata	peronospora	mandipropamide	Al massimo 3 trattamenti annui. Non più di 2 trattamenti se impiegato con mancozeb.
156	patata	peronospora	flupicolide	Al massimo 3 trattamenti all'anno
158	patata	elateridi	Concia dei tuberi seme	
167	pisello	oidio	ciproconazolo	Al massimo 2 trattamenti all'anno
169	pomodoro coltura protetta	peronospora	mandipropamide	Al massimo 3 trattamenti annui. Non più di 2 trattamenti se impiegato con mancozeb.
169	pomodoro coltura protetta	peronospora	flupicolide	Al massimo 3 trattamenti all'anno
169	pomodoro coltura protetta	peronospora	dimetomorf	Al massimo 3 trattamenti all'anno
178	basilico	marciumi molli radicali e basali	<i>Trichoderma spp.</i>	Autorizzato solo su <i>Pythium</i>
182	prezzemolo	rizottoniosi	<i>Trichoderma spp.</i>	
183	rucola pieno campo	peronospora	mandipropamide	Al massimo 2 trattamenti per ciclo colturale
184	rucola pieno campo	sclerotinia	Pyraclostrobin + boscalid	Al massimo 2 trattamenti per ciclo colturale
187	sedano	rizottoniosi	<i>Trichoderma spp.</i>	
192	lattughino IV gamma	peronospora	mandipropamide	Al massimo 1 trattamenti per ciclo colturale, al massimo 4 all'anno

PAG.	COLTURA	AVVERSITA'	P.A. DA INTRO-DURRE	NOTE
198	dolcetta IV gamma	rizottoniosi	<i>Trichoderma spp</i>	
203	cicorino IV gamma	moria delle piantine	<i>Trichoderma spp</i>	
207	foglie e steli di brassica IV gamma	Rizoctonia e pythium	<i>Trichoderma spp</i>	
210	bietola IV gamma	Moria delle piantine	<i>Trichoderma spp</i>	
213	spinacino IV gamma	rizoctonia	<i>Trichoderma spp</i>	
216	rucola coltura protetta	peronospora	mandipropamide	Al massimo 1 trattamenti per ciclo col- turale, al massimo 4 all'anno
221	barbabietola	elateridi	Concia dei semi	
225	pomodoro pieno campo	peronospora	mandipropamide	Al massimo 3 trattamenti annui. Non più di 2 trattamenti se impiegato con man- cozeb.
225	pomodoro pieno campo	peronospora	flupicolide	Al massimo 3 trattamenti all'anno
227	pomodoro pieno campo	oidio	ciproconazolo	Al massimo 3 trattamenti annui con IBE indipendent. dall'avversità
302	fagiolino	pendimetalin		Diserbo pre-emergenza 2,5 l; 38,72%
306	lattuga	pendimetalin		Diserbo pre-emergenza 2,5l; 38,72%
307	indivia riccia	pendimetalin		Diserbo pre-emergenza 2,5l; 38,72%
308	indivia scarola	pendimetalin		Diserbo pre-emergenza 2,5l; 38,72%

Il presente decreto è inviato al Sig. Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, al Settore IPA, agli STAPA CePICA ed al Settore Stampa, Documentazione Informazione e Bollettino ufficiale per la relativa pubblicazione e all'Area 02-Settore 01- Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici- Archiviazione Decreti Dirigenziali".

Passari