

ALLEGATO

COLTURA	AVVERSITA'	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
DIFESA			
Actinidia	Cimice asiatica	Piretrine	
Aglione	Peronospora	Pyraclostrobin	Con i QOI al massimo 2 interventi annui indipendentemente dall'avversità
Agrumi	Fitoftora	Fosfonato di potassio	Autorizzato su limone, mandarino, arancio
Agrumi	Afidi Mosca Bianca	Piretrine	Autorizzato su clementino e pompelmo
Agrumi	Acari	Acequinocyl	Autorizzato su Arancio, Mandarino, Clementino, Limone
Albicocco	Monilia	Pyrimethanil	Al massimo 1 intervento all'anno. Cyprodinil e Pyrimethanil sono alternativi tra loro
Albicocco	Cimice asiatica	Tebufenozide	
Avena segale triticale	Afidi	Piretrine	
Barbabietola da zucchero	Oidio Cercospora	Difenoconazolo	Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Barbarea baby leaf	Peronospora	Fosfonato di potassio	
Basilico	Peronospora Alternariosi	Pyraclostrobin	Con QOI al massimo 2 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità
Bietola da foglie baby leaf	Peronospora	Fosfonato di potassio	
Bietole da foglia	Peronospora	Pyraclostrobin	Con i QOI al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Carciofo	Peronospora Oidio	Pyraclostrobin	Con i QOI al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Cavoli a infiorescenza (Cavolfiore, cavolo broccolo)	Peronospora Alternaria	Pyraclostrobin	Con i QOI al massimo 2 interventi annui indipendentemente dall'avversità
Cavoli a testa (cavoli cappucci, cavolo verza)	Peronospora Alternaria	Pyraclostrobin	Con i QOI al massimo 2 interventi annui indipendentemente dall'avversità.

ALLEGATO

			Non ammesso su cavolo di Bruxelles
Cetriolo	Ragnetto rosso	Milbemectina	Al massimo un intervento all'anno contro quest'avversità
Cicoria	Bremia lactucae	Oxathiapiprolin + Mandipropamid	Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno.
Cicorino baby leaf	Peronospora	Fosfonato di potassio	
Cicorino baby leaf	Bremia lactucae	Oxathiapiprolin + Mandipropamid	Con i CAA al massimo 4 interventi all'anno.
Cipolla	Peronospora (<i>Peronospora destructor</i>)	Pyraclostrobin	Con i QOI al massimo 2 interventi annui indipendentemente dall'avversità
Cotogno	Afidi	Piretrine	
Cotogno	Carpocapsa	Modifica Soglia intervento	La soglia di intervento è pari all'0,3% frutti con iniziale infestazione larvale a giugno, 0,5% a luglio, 0,8% ad agosto
Dolcetta baby leaf	Peronospora	Fosfonato di potassio	
Dolcetta baby leaf	Bremia lactucae	Oxathiapiprolin + Mandipropamid	Con i CAA al massimo 4 interventi all'anno.
Floreali e ornamentali	Ragnetto rosso <i>Liriomyza</i> spp.	Milbemectina	Eliminata la nota "solo su ornamentali"
Floricole ed ornamentali	Marciumi basali	Metalaxyl M	Eliminato
Foglie e steli di Brassica baby leaf	Peronospora	Fosfonato di potassio	
Fragola	Ragnetto giallo	Milbemectina	Al massimo 1 intervento annuo contro questa avversità esclusi i prodotti biologici
Fragola in serra	Botrite	Isofetamid	Con i SDHI al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Frumento orzo,	Afidi	Piretrine	
Garofano	Ruggine	Difenoconazolo	Al massimo 1 intervento all'anno
Indivia riccia e Scarola	Peronospora	Pyraclostrobin	Con QOI al massimo 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità
Indivia riccia e Scarola	Peronospora	Fosfonato di potassio	

ALLEGATO

Indivia riccia e scarola	<i>Bremia lactucae</i>	Oxathiapiprolin + Mandipropamid	Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno.
Indivia riccia e scarola	<i>Bremia lactucae</i>	Oxathiapiprolin + Mandipropamid	Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno.
Lampone	Tripidi	Piretrine	
Lampone	Ragnetto rosso	Milbemectina	
Lattuga	Peronospora	Pyraclostrobin	Con QOI al massimo 3 interventi per anno indipendentemente dall'avversità
Lattuga	Peronospora	Fosfonato di potassio	
Lattughino baby leaf	Peronospora	Fosfonato di potassio	
Lattughino baby leaf	<i>Bremia lactucae</i>	Oxathiapiprolin + Mandipropamid	Con CAA 1 per ciclo, 4 per anno
Mandorlo	Afidi	Piretrine	
Melanzana	Marciume pedale	Oxathiapiprolin + Mandipropamid	
Melanzana	Ragnetto rosso	Milbemectina	Al massimo 2 interventi all'anno contro questo fitofago
Mirtillo	<i>Drosophila suzukii</i>	Piretrine	Solo in serra
Mirtillo	Ragnetto rosso	Milbemectina	
Nespolo	Ticchiolatura	Difenoconazolo	Al massimo 1 intervento all'anno
Nocciolo	Cimice asiatica	Piretrine	
Nocciolo	Marciumi radicali	<i>Trichoderma asperellum</i> e <i>gamsii</i>	Autorizzato solo su Armillaria
Nocciolo	<i>Oidio</i> (<i>Erysiphe corylacearum</i> , <i>Phyllactinia corylicola</i>)	Zolfo	
Noce	Afidi	Piretrine	
Noce	Marciumi radicali	<i>Trichoderma asperellum</i> e <i>gamsii</i>	
Officinali e erbe fresche	Peronospora	Pyraclostrobin	Con i QOI al massimo 3 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. Autorizzato solo su rosmarino, timo.
Olivo	Mosca dell'olivo	Piretrine	
Olivo	Mosca dell'olivo Tignola	Azadiractina	

ALLEGATO

Patata	Peronospora; Alternariosi	Pyraclostrobin	Con i QOI al massimo 2 interventi annui indipendentemente dall'avversità
Patata	Peronospora	Fosfonato di potassio	
Peperone	Oidio	Pyraclostrobin	Con i QOI al massimo 2 interventi annui indipendentemente dall'avversità
Pesco	Cancro dei rametti	Difenoconazolo	1) Con gli IBE al massimo 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (2) Al massimo 2 interventi all'anno. 3) Non ammesso su seccume rameale
Pesco	Monilia	Pyrimethanil	Tra Cyprodinil, Fludioxonil e Pyrimethanil al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. Sostanze in alternativa tra loro.
Pesco	Cimice asiatica	Tebufenozide	Al massimo 2 interventi all'anno
Pomodoro in coltura protetta	Oidio, Alternariosi	Pyraclostrobin	Con i QOI al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Pomodoro in coltura protetta	Peronospora	Fosfonato di potassio	
Pomodoro in coltura protetta	Acaro rugginoso del pomodoro Ragnetto rosso	Milbemectina	Al massimo 3 interventi all'anno contro questo
Pomodoro in pieno campo	Oidio	Pyraclostrobin	Con i QOI al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Pomodoro in pieno campo	Septoriosi Oidio Alternaria	Difenoconazolo e tebuconazolo	Eliminata la nota "Difenoconazolo, Tebuconazolo al massimo una sola volta all'anno, s.a. in alternativa fra loro"
Pomodoro in pieno campo	Eriofide rugginoso del pomodoro Ragnetto rosso	Milbemectina	Al massimo 2 interventi acaricidi all'anno sulla coltura
Porro	Peronospora	Pyraclostrobin	Con i QOI al massimo 3 interventi annui indipendentemente dall'avversità

ALLEGATO

Prezzemolo	Alternariosi	Pyraclostrobin	Con i QOI al massimo 3 interventi per anno indipendentemente dall'avversità
Radicchio	Bremia lactucae	Oxathiapiprolin + Mandipropamid	Con i CAA al massimo 4 interventi all'anno.
Ribes e uva spina	Ragnetto rosso	Milbemectina	
Rovo	Ragnetto rosso	Milbemectina	
Rucola	Peronospora	Pyraclostrobin	Con QOI al massimo 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità
Rucola	Peronospora	Fosfonato di potassio	
Rucola baby leaf	Peronospora	Fosfonato di potassio	
Rucola baby leaf	Bremia lactucae	Oxathiapiprolin + Mandipropamid	Con CAA 1 per ciclo, 4 per anno
Spinacino Baby leaf	Peronospora	Fosfonato di potassio	
Spinacio	Peronospora	Pyraclostrobin	Con i QOI al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Susino	Afidi; Tripidi	Azadiractina	
Susino	Ragnetto rosso	Acequinocyl	Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità
Uva da tavola	Tripidi	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	Eliminato
Vite da tavola	Botrite	<i>Trichoderma asperellum gamsii</i> e	
Vite da tavola	Drosophila suzuki	Piretrine	
Vite da tavola	Ragnetto rosso	Acequinocyl	Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno
Vite da tavola	Acariosi della vite	Tebufenpyrad	Al massimo 1 intervento acaricida sulla coltura all'anno
Vite da vino	Botrite	<i>Trichoderma asperellum gamsii</i> e	
Vite da vino	Ragnetto rosso	Acequinocyl	Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno

ALLEGATO

Zucchini	Ragnetto rosso	Milbemectina	Al massimo un intervento per ciclo contro quest'avversità
DISERBO			
Aglio	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	In post trapianto sulle colture trapiantate da bulbo e bulbillo
Avena Segale Triticale	Monocotiledoni e Dicotiledoni	Halaxifen methyl	In post emergenza precoce
Avena Segale Triticale	Monocotiledoni e Dicotiledoni	Pinoxaden	In post emergenza Ammesso solo su triticale
Carciofo	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	In pre trapianto
Carota	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	In post emergenza
Frumento e orzo	Monocotiledoni e Dicotiledoni	Halaxifen methyl	In post emergenza precoce.
Frumento e orzo	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	Eliminato
Indivia e Scarola	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	In pre trapianto
Lattuga	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	In pre trapianto
Pomodoro in pieno campo	Diserbo	Bifenox	Al massimo ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su soia e pomodoro.
Pomodoro industria	Diserbo		Approvato l'inserimento della nota "Si consiglia per contenere la diffusione delle infestanti Orobanche e Cyperus spp. di: - Pulire la raccogliatrice ed ogni altra attrezzatura dopo le operazioni in campo, in particolare quando si opera in zone già infestate; - Avvisare il contoterzista della presenza delle suddette infestanti. Mettere in atto rotazioni adeguate; in particolare: - per contenere Orobanche, avvicinare con pisello, mais, soia, sorgo, aglio; evitare al contrario la successione a favino che ne favorisce la diffusione, o per contenere Cyperus, avvicinare con cereali, mais ed erba medica che ne contengono lo sviluppo. - Mantenere traccia degli appezzamenti infestati, per intervenire tempestivamente"

ALLEGATO

Prezzemolo	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	In pre trapianto
Radicchio	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	In pre trapianto
Tutte	Tutte	S-metolachlor	La commercializzazione, la vendita e la distribuzione da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati sono consentite fino al 14giugno 2024 mentre l'impiego da parte degli utilizzatori finali è consentito non oltre il 23 luglio 2024
FITOREGOLATORI			
Pomodoro da industria	Fitoregolatore	NAA + NAD	Pomodoro da industria
Pomodoro da industria	Fitoregolatore	GA3 + NAA	Pomodoro da industria
Agrumi	Fitoregolatore	GA3 + NAA	Autorizzato su Arancio, Mandarino, Clementino, Limone