ALLEGATO

COLTURA	AVVERSITA'	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
DIFESA			
Actinidia	Cancro batterico	Forchlorfenuron	Impiegabile esclusivamente per una sola finalità, o contro il PSA oppure per l'incremento del calibro
Agrumi	Mosca della frutta	Metodo Attract and Kill conEsfenvalerate	
Agrumi	Afidi	Flupyradifurone	1 intervento all'anno. Non autorizzato su Toxoptera
Agrumi	Pseudococcidi	Flupyradifurone	1 intervento all'anno. Autorizzato solo su Planococcus citri,
Agrumi	Aleirode fioccoso	Flupyradifurone	1 intervento all'anno
Agrumi	Mosca bianca spinosa degli agrumi	Flupyradifurone	1 intervento all'anno
Albicocco	Moniliosi dei fruttiferi	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Albicocco	Moniliosi dei fruttiferi	Zolfo	
Albicocco	Oidio (Sphaeroteca pannosa)	Olio essenziale di arancio dolce	
Barbabietola da zucchero	Cercospora	Fluopyram	
Barbarea baby leaf	Mal bianco	Olio essenziale di arancio dolce	
Barbarea baby leaf	Afidi	Flonicamide	Al massimo 1 trattamento per ciclo
Barbarea baby leaf	Muffa grigia	Isofetamid	Con SDHI al massimo 2 interventi
Barbarea baby leaf	Sclerotinia	Isofetamid	Con SDHI al massimo 2 interventi
Basilico	Peronospora	Olio essenziale di arancio dolce	
Basilico	Oidio	Olio essenziale di arancio dolce	
Basilico	Oidio	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	Non autorizzato in pieno campo
Bietola da costa e da foglia	Marciume secco	Trichoderma asperellum e gamsii	
Bietola da costa e da foglia	Sclerotinia	Trichoderma asperellum e gamsii	
Bietola da costa e da foglia	Moria delle piantine	Trichoderma asperellum e gamsii	
Bietola da costa e da foglia	Cercospora	Difenoconazolo	Al massimo 1 trattamento sulla coltura. Non autorizzato in coltura protetta
Bietola da foglie e da coste	Afidi	Acetamiprid	Eliminato
Bietola da foglie e da coste	Muffa grigia	Interventi agronomici: - evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le irrigazioni. Interventi chimici: - da eseguire tempestivamente.	
Bietola da foglie e da coste	Muffa grigia	Pythium oligandrum	
Bietola da foglie e da coste	Muffa grigia	Penthiopyrad	Con SDHI al massimo 1 intervento all'anno

Bietola da foglie e da	Muffa grigia	Isofetamid	Con SDHI al massimo 1 intervento
coste Bietola da foglie e da	Muffa grigia	Boscalid	all'anno Con SDHI al massimo 1 intervento
coste			all'anno
Bietola da foglie e da coste	Muffa grigia	Pyraclostrobin	
Bietolino da foglia baby leaf coltura protetta	Afidi	Flonicamide	Al massimo 1 trattamento per ciclo
Bietolino da foglia baby leaf coltura protetta	Marciume basale	Isofetamid	Con SDHI al massimo 2 interventi
Bietolino da foglia baby leaf coltura protetta	Muffa grigia	Isofetamid	Con SDHI al massimo 2 interventi
Carota	Marciume basale	Bacillus amyloliquefaciens	
Carota	Alternariosi	Bacillus amyloliquefaciens	
Castagno	Marciumi radicali	Trichoderma asperellum e gamsii	Autorizzato solo su Armillaria.
Cavoli a foglia	Marciumi basali	Trichoderma asperellum e gamsii	
Cavoli a infiorescenza	Altica	Acetamiprid	Eliminato
Cavoli a infiorescenza	Afidi	Acetamiprid	Eliminato
Cavoli a infiorescenza	Marciumi basali	Trichoderma asperellum e gamsii	
Cavoli a infiorescenza	Alternaria	Bacillus amyloliquefaciens	
Cavoli a infiorescenza	Elateridi	Tefluthrin	Eliminata la nota "ammesso solo su cavolfiore"
Cavoli a testa	Alternaria	Bacillus amyloliquefaciens	
Cavoli a testa	Altica	Acetamiprid	Autorizzato solo su cavolo di Bruxelles
Cavoli a testa	Afidi	Acetamiprid	Autorizzato solo su cavolo di Bruxelles
Cavolo rapa	Marciumi basali	Trichoderma asperellum e gamsii	
Cetriolo	Mal bianco	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Cicoria	Oidio	Olio essenziale di arancio dolce	Autorizzato solo su Cicoria Witloof e Cicoria belga
Cicorino baby leaf	Afidi	Flonicamide	Al massimo 1 trattamento per ciclo
Cicorino baby leaf	Muffa grigia	Isofetamid	Con SDHI al massimo 2 interventi. Non autorizzato in pieno campo
Cicorino baby leaf	Marciume basale	Isofetamid	Con SDHI al massimo 2 interventi. Non autorizzato in pieno campo
Ciliegio	Mosca delle ciliege	Cipermetrina	Eliminato
Ciliegio	Monilia	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Ciliegio	Afide nero	Flupyradifurone	1 intervento all'anno
Ciliegio	Mosca delle ciliegie	Flupyradifurone	1 intervento ogni 2 anni
Ciliegio	Afide nero	Piretrine pure	Tra piretrine piretroidi ed etofenprox al massimo 3 interventi
Ciliegio	Drosophila suzukii	Piretrine pure	Tra piretrine piretroidi ed etofenprox al massimo 3 interventi
Ciliegio	Cimice asiatica	Piretrine pure	Tra piretrine piretroidi ed etofenprox al massimo 3 interventi

Ciliegio	Mosca delle ciliegie	Attract and kill con: Deltametrina	
Cipolla	Botrite	Bacillus amyloliquefaciens	
Cocomero	Mal bianco	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Cocomero	Mal bianco	Olio essenziale di arancio dolce	
Cocomero	Tripidi	Olio essenziale di arancio dolce	
Cocomero	Aleurodidi	Olio essenziale di arancio dolce	
Cotogno	Ticchiolatura	Olio di arancio dolce	
Cotogno	Mosca della frutta	Metodo Attract and Kill con Esfenvalerate	
Dolcetta baby leaf	Oidio	Olio essenziale di arancio dolce	
Dolcetta baby leaf	Afidi	Flonicamide	Al massimo 1 trattamento per ciclo
Dolcetta baby leaf	Muffa grigia	Isofetamid	Con SDHI al massimo 2 interventi
Dolcetta baby leaf	Marciume basale	Isofetamid	Con SDHI al massimo 2 interventi
Fagiolino	Muffa grigia	Bacillus amyloliquefaciens	
Fagiolino	Afidi	Flupyradifurone	Al massimo 1 intervento ogni 2 anni sulla coltura
Fagiolino	Afidi	Flonicamide	Al massimo 1 intervento
Fagiolo	Muffa grigia	Bacillus amyloliquefaciens	
Fagiolo	Afidi	Flupyradifurone	Approvato nel limite di 1 intervento ogni 2 anni sulla coltura
Fagiolo	Afidi	Flonicamide	Al massimo 1 intervento
Fava	Botrite	Bacillus amyloliquefaciens	
Fava	Afidi	Flupyradifurone	Approvato nel limite di 1 intervento ogni 2 anni sulla coltura
Finocchio	Sclerotinia	Bacillus amyloliquefaciens	
Fiori commestibili	Aleurodidi	Olio essenziale di arancio dolce	
Fiori commestibili	Oidio	Olio essenziale di arancio dolce	
Fiori commestibili	Muffa grigia	Bacillus amyloliquefaciens	
Fiori commestibili	Sclerotinia	Bacillus amyloliquefaciens	
Foglie di brassica baby leaf	Oidio	Olio essenziale di arancio dolce	
Foglie di brassica baby leaf	Afidi	Flonicamide	Al massimo 1 trattamento per ciclo
Foglie di brassica baby leaf	Marciume basale	Isofetamid	Con SDHI al massimo 2 interventi
Foglie di brassica baby leaf	Botrite	Isofetamid	Con SDHI al massimo 2 interventi
Fragola	Muffa grigia	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Fragola	Oidio	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Fragola	Marciume del colletto	Fosfonato di potassio	Non autorizzato in pieno campo

Indivia	Oidio	Difenoconazolo	Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. Non autorizzato in coltura protetta
Indivia e scarola	Afidi	Flonicamide	Al massimo 1 trattamento per ciclo
Kaki	Mosca della frutta	Cyantraniliprole	Esca attrattiva
Kaki	Mosca della frutta	Metodo Attract and Kill con Esfenvalerate	
Lampone	Afidi	Acetamiprid	Eliminato
Lampone	Moscerino piccoli frutti	Acetamiprid	Eliminato
Lampone	Cicaline	Acetamiprid	Eliminato
Lampone	Cimice asiatica	Acetamiprid	Eliminato
Lattuga a cespo	Afidi	Acetamiprid	Eliminato
Lattuga a cespo	Tripidi	Acetamiprid	Eliminato
Lattuga a cespo	Afidi	Flonicamide	Al massimo 1 trattamento per ciclo
Lattughino baby leaf	Afidi	Flonicamide	Al massimo 1 trattamento per ciclo
Lattughino baby leaf	Botrite	Isofetamid	Con SDHI al massimo 2 interventi
Lattughino baby leaf	Marciume basale	Isofetamid	Con SDHI al massimo 2 interventi
Mandorlo	Monilia	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Melanzana	Muffa grigia	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Melanzana	Oidio	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Melo	Mosca della frutta	Metodo Attract and Kill con Esfenvalerate	
Melograno	Oidio	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Mirtillo	Marciumi del colletto	Fosfonato di potassio	
Nespolo	Ticchiolatura	Olio essenziale di arancio dolce	
Nespolo	Ticchiolatura	Fosfonato di potassio	
Nocciolo	Moniliosi dei fruttiferi	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Nocciolo	Oidio	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Nocciolo	Marciumi	Trichoderma asperellum e gamsii	
Officinali e erbe fresche	Botrite	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	Non autorizzato in pieno campo
Officinali e erbe fresche	Oidio	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	Non autorizzato in pieno campo
Officinali e erbe fresche	Oidio	Olio essenziale di arancio dolce	Non autorizzato su prezzemolo
Officinali e erbe fresche	Botrite	Bacillus amyloliquefaciens	
Officinali e erbe fresche	Marciumi basali	Bacillus amyloliquefaciens	

Orzo	Elmintosporiosi	Folpet	Al massimo 1 intervento sulla coltura
Patata	Rizottoniosi	Trichoderma asperellum e gamsii	
Peperone	Batteriosi	Bacillus amyloliquefaciens	Autorizzato solo su Xanthomonas spp.
Peperone	Afidi	Acetamiprid	Non autorizzato in coltura protetta
Peperone	Aleurodidi	Acetamiprid	Non autorizzato in coltura protetta
Pero	Mosca della frutta	Metodo Attract and Kill con Esfenvalerate	
Pesco	Monilia	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Pesco	Bolla	Polisolfuro di calcio	
Pesco	Mal bianco	Polisolfuro di calcio	
Pesco	Monilia	Polisolfuro di calcio	
Pesco	Anarsia	Acetamiprid	N.2 interventi all'anno
Pesco	Afidi	Acetamiprid	N.2 interventi all'anno
Pesco	Cidia	Acetamiprid	N.2 interventi all'anno
Pesco	Afidi	Piretrine pure	Tra piretrine, piretroidi e etofenprox al massimo 5 interventi all'anno. Solo su Hyalopterus spp.
Pesco	Cimice asiatica	Piretrine pure	Tra piretrine, piretroidi e etofenprox al massimo 5 interventi all'anno
Pisello	Afidi	Flonicamide	Al massimo 1 intervento
Pomodoro in coltura protetta	Peronospora	Bacillus amyloliquefaciens	
Pomodoro in coltura protetta	Maculatura batterica del pomodoro	Bacillus amyloliquefaciens	
Pomodoro in coltura protetta	Batteriosi del fusto	Bacillus amyloliquefaciens	
Pomodoro in coltura protetta	Muffa grigia	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Pomodoro in coltura protetta	Oidio	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Pomodoro in pieno campo	Batteriosi	Bacillus amyloliquefaciens	Autorizzato solo su Xantomonas spp. e Pseudomonas spp.
Pomodoro in pieno campo	Peronospora	Bacillus amyloliquefaciens	
Pomodoro in pieno campo	Muffa grigia	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Pomodoro in pieno campo	Oidio	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Porro	Botrite	Bacillus amyloliquefaciens	
Prezzemolo	Septoriosi	Benzovindiflupyr	Al massimo 1 intervento all'anno. Non autorizzato in coltura protetta
Prezzemolo	Mal bianco	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	Non autorizzato in pieno campo
Radicchio	Oidio	Olio essenziale di arancio dolce	

Radicchio	Afidi	Flonicamide	Al massimo 1 trattamento per ciclo
Rovo inerme	Afidi	Acetamiprid	Eliminato
Rovo inerme	Moscerino piccoli frutti	Acetamiprid	Eliminato
Rovo inerme	Cicaline	Acetamiprid	Eliminato
Rovo inerme	Cimice asiatica	Acetamiprid	Eliminato
Rucola	Aleurodidi	Olio essenziale di arancio dolce	
Rucola	Oidio	Olio essenziale di arancio dolce	
Rucola	Afidi	Flonicamide	Al massimo 1 trattamento per ciclo
Rucola baby leaf	Aleurodidi	Olio essenziale di arancio dolce	
Rucola baby leaf	Oidio	Olio essenziale di arancio dolce	
Rucola baby leaf	Afidi	Flonicamide	Al massimo 1 trattamento per ciclo
Rucola baby leaf	Marciume basale	Isofetamid	Non autorizzato in pieno campo. Con SDHI al massimo 2 interventi
Rucola baby leaf	Botrite	Isofetamid	Non autorizzato in pieno campo. Con SDHI al massimo 2 interventi
Rucola baby leaf	Afidi	Flonicamide	Al massimo 1 trattamento per ciclo
Sedano	Nottue fogliari	Azadiractina	
Spinacino baby leaf	Afidi	Flonicamide	Al massimo 1 trattamento per ciclo
Spinacino baby leaf	Sclerotinia	Isofetamid	Con SDHI al massimo 2 interventi. Non autorizzato in pieno campo
Spinacino baby leaf	Muffa grigia	Isofetamid	Con SDHI al massimo 2 interventi. Non autorizzato in pieno campo
Spinacio	Oidio	Olio essenziale di arancio dolce	
Spinacio	Afidi	Acetamiprid	Eliminato
Spinacio	Tripidi	Acetamiprid	Eliminato
Susino	Mosca mediterranea della frutta	Metodo Attract and Kill con Esfenvalerate	
Susino	Monilia	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Susino	Monilia	Zolfo	
Susino	Afidi	Flupyradifurone	Al massimo 1 intervento all'anno su Afidi
Susino	Tentredini del susino	Flupyradifurone	Al massimo 1 intervento ogni 2 anni su Tentredini
Vite da tavola	Muffa grigia	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Vite da tavola	Oidio	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Vite da vino	Cicaline	Olio minerale	
Vite da vino	Muffa grigia	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Vite da vino	Oidio	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	

Zucca	Mal bianco	Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce	
Zucca	Mal bianco	Olio essenziale di arancio dolce	
DISERBO			
Aglio	Diserbo dicotiledoni in post- emergenza	Fluroxipir	
Avena, segale, triticale	Diserbo post emergenza dicotiledoni	Bensulfuron metile	
Basilico	Diserbo in post emergenza graminacee	Propaquizafop	
Bietola da costa e da foglia	Diserbo in in pre emergenza dicotiledoni	Metamitron	
Cece	Diserbo in pre emergenza (graminacee e dicotiledoni)	Clomazone	
Cetriolo	Diserbo in pre trapianto e pre emergenza su graminacee e dicotiledoni	Clomazone	
Cipolla	Diserbo pre emergenza	Acido pelargonico	Eliminare la nota "Diserbo dell'interfila, assicurarsi che il prodotto non colpisca la coltura"
Cipolla	Diserbo post emergenza	Acido pelargonico	Diserbo dell'interfila, assicurarsi che il prodotto non colpisca la coltura
Cocomero	Diserbo in pre trapianto e pre emergenza su graminacee e dicotiledoni	Clomazone	
Drupacee	Dicotiledoni e Graminacee	Flazasulfuron	come residuale in fase di produzione
Fava	Diserbo in pre emergenza (graminacee e dicotiledoni)	Clomazone	
Mais	Infestanti dicotiledoni	Prosulfuron	Eliminata la nota "Ammessa 1 sola applicazione ogni 3 anni sullo stesso appezzamento."
Mandorlo	Dicotiledoni e Graminacee	Flazasulfuron	come residuale su produzione
Mandorlo	infestanti dicotiledoni in post-emergenza e e per uso spollonante	Fluroxipir	"in produzione" per il controllo delle dicotiledoni e come spollonante
Nocciolo	Dicotiledoni e Graminacee	Flazasulfuron	come residuale su produzione
Nocciolo	infestanti dicotiledoni in post-emergenza e e per uso spollonante	Fluroxipir	"in produzione" per il controllo delle dicotiledoni e come spollonante
Noce	Dicotiledoni e Graminacee	Flazasulfuron	come residuale su produzione

Noce	infestanti dicotiledoni in post-emergenza e e per uso spollonante	Fluroxipir	
Pistacchio	Dicotiledoni e Graminacee	Flazasulfuron	come residuale in fase di produzione
Pomacee	Dicotiledoni e Graminacee	Flazasulfuron	come residuale in fase di produzione
Prezzemolo	Diserbo in post emergenza graminacee	Propaquizafop	
Ravanello	Diserbo in pre emergenza (graminacee e dicotiledoni)	Clomazone	
Sedano	Diserbo in pre trapianto e pre emergenza (graminacee e dicotiledoni)	Clomazone	
Soia	Diserbo e pre emergenza su graminacee e dicotiledoni	Metobromuron	
Sorgo	Infestanti dicotiledoni	Prosulfuron	Eliminata la nota "Ammessa 1 sola applicazione ogni 3 anni sullo stesso appezzamento."
Spinacio	Diserbo dicotiledoni in pre emergenza	Metamitron	
Tutte	Tutte	Metribuzin	L'uso è consentito fino 24.11.2025
Tutte		Tritosulfuron	Eliminato
Zucca	Diserbo in pre trapianto e pre emergenza su graminacee e dicotiledoni	Clomazone	