

Allegato I

COLTURA	AVVERSITA'	S.A.	LIMITAZIONI
DIFESA			
Agrumi	Gommosi del colletto	Metalaxyl-m	N. interventi = 1 Nota: in alternativa con il Metalaxil Nota: Solo su arancio, mandarino, clementino, pompelmo
Agrumi	Aleirode fioccoso	Maltodestrine	Inserire
Agrumi	Mosca bianca spinosa degli agrumi	Cyantraniliprole	N. interventi= 1 Nota:Consentito ogni 3 anni
Agrumi	Aleirode fioccoso	Cyantraniliprole	N. interventi= 1 Nota:Consentito ogni 3 anni
Agrumi	Mosca della frutta	Cyantraniliprole	Note: Consentito ogni 3 anni N.1 intervento all'anno
Cetriolo	Nematode galligeno	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Sostituire con: <i>Paecilomyces lilacinus</i> = <i>Purpureocillium lilacinum</i> "
Cetriolo	Antracnosi	Prodotti rameici	Inserire Nota:Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame/ ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Cetriolo	Cladosporiosi	Prodotti rameici	Inserire Nota:Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame/ ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Cicoria	Ruggine	Prodotti rameici	Inserire Nota:Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame/ ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Cocomero	Nematode galligeno	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Sostituire con: <i>Paecilomyces lilacinus</i> = <i>Purpureocillium lilacinum</i> "
Cocomero	Ragnetto rosso	Olio essenziale di arancio dolce	Inserire
Fagiolo	Ruggine del fagiolo	Protioconazolo	Inserire Nota: Tra difenoconazolo e Protioconazolo al massimo 2 interventi all'anno
Floreali e ornamentali	Cancro del cipresso	Prodotti rameici	Inserire

Allegato I

			Inserire nei Criteri intervento consigli: -Eliminare tempestivamente i rami infetti tagliando almeno 20-30 cm sotto la zona colpita. -Evitare eccessi idrici ed effettuare concimazioni equilibrate -Intervenire con prodotti rameici in caso di eventi che possano creare lesioni, come grandinate e gelo.
Floreali ed ornamentali (incluso rose)	Acari	Olio essenziale di arancio dolce	Inserire
Fragola	Ragnetto giallo	Maltodestrine	Inserire
Fragola	Ragnetto rosso	Olio essenziale di arancio dolce	Inserire
Fragola	Ragnetto giallo	Olio essenziale di arancio dolce	Inserire
Fragola	Aleirodidi	Olio essenziale di arancio dolce	Inserire
Frumento	Fusariosi	Mefentrifluconazolo	Inserire
Frumento	Septoriosi	Bicarbonato di potassio	Inserire
Frumento	Ruggine	Bicarbonato di potassio	Inserire
Frumento	Septoria	Zolfo	Inserire
Frumento	Ruggine	Zolfo	Inserire
Frumento	Septoriosi	Prodotti rameici	Inserire Nota: Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame/ ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Kaki	Cocciniglia	Pyriproxyfen	Inserire
Lampone	Tripidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserire
Lampone,	Ragnetto rosso	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserire
Lattuga	Marciume basale	Fluopyram	Eliminare
Lattuga	Marciume basale	Trifloxystrobin	Eliminare
Lattuga	<i>Pythium spp.</i>	Propamocarb + Fosetil	No coltura protetta
Melanzana	Nematode galligeno	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Sostituire con: <i>Paecilomyces lilacinus</i> = <i>Purpureocillium lilacinum</i> "
Melanzana	Ragnetto rosso	Olio essenziale di arancio dolce	Inserire
Melo	Cocciniglia di san Jose	Maltodestrine	Inserire
Melograno	Nematode galligeno	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Eliminare
Melone	Nematode galligeno	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Sostituire con: <i>Paecilomyces lilacinus</i> = <i>Purpureocillium lilacinum</i> "
Melone	Ragnetto rosso	Olio essenziale di arancio dolce	Inserire

Allegato I

Mirtillo	Ragnetto rosso	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserire
Patata	Nematodi	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Eliminare
Patata	Alternariosi	Protioconazolo	Inserire Nota: con gli IBE al massimo 2 interventi all'anno
Patata	Alternariosi	Fluopyram	Inserire Nota: Con SDHI al massimo tre interventi all'anno
Peperone	Nematode galligeno	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Sostituire con: <i>Paecilomyces lilacinus</i> = <i>Purpureocillium lilacinum</i> "
Peperone	Ragnetto rosso	Olio essenziale di arancio dolce	Inserire
Pero	Cocciniglia di san Jose	Maltodestrine	Inserire
Pisello	Antracnosi del pisello	Prodotti rameici	Inserire Nota: Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame/ ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Pisello	Antracnosi del pisello	Protioconazolo	Inserire Nota: Tra difenoconazolo e Protioconazolo al massimo 2 interventi all'anno
Pomodoro in coltura protetta	Nematode galligeno	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Sostituire con: <i>Paecilomyces lilacinus</i> = <i>Purpureocillium lilacinum</i> "
Pomodoro in coltura protetta	Septoriosi	Prodotti rameici	Inserire Nota: Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame/ ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Pomodoro in coltura protetta	Acaro rugginoso del pomodoro	Sali potassici di acidi grassi	<i>Inserire</i>
Pomodoro in pieno campo	Nematodi	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Sostituire con: <i>Paecilomyces lilacinus</i> = <i>Purpureocillium lilacinum</i> "
Pomodoro in pieno campo	Eriofide	Sali potassici di acidi grassi	Inserire
Ravanello	Sclerotinia		Inserire nuova avversità
Ravanello	Sclerotinia	Eugenolo	Inserire
Ravanello	Sclerotinia	Geraniolo	Inserire
Ravanello	Sclerotinia	Timolo	Inserire
Ravanello	Sclerotinia	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserire
Ribes e uve spina	Ragnetto rosso	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserire
Rovo	Ragnetto rosso	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserire

Allegato I

Ruola	Sclerotinia	Isofetamid	Inserire No pieno campo Nota:Con SDHI al massimo 2 interventi all'anno
Ruola	Muffa grigia	Isofetamid	Inserire No pieno campo Nota:Con SDHI al massimo 2 interventi all'anno
Ruola	Peronospora		Inserire sull'avversità Peronospora l'agente causale <i>Bremia lactucae</i>
Ruola	Peronospora	Oxathiapiprolin	
Ruola	Afidi	Maltodestrina	Inserire no sulla coltura protetta
Ruola	Aleurodidi	Maltodestrina	Eliminare
Ruola	Ragnetto rosso	Maltodestrina	Eliminare
Ruola baby leaf	Ragnetto rosso	Maltodestrina	Eliminare
Ruola baby leaf	Afidi	Maltodestrina	Eliminare
Vite da Tavola	Ragnetto rosso	Maltodestrine	Inserire
Vite da Tavola	Acariosi	Maltodestrine	Inserire
Vite da Vino	Ragnetto rosso e giallo	Maltodestrina	Inserire
Vite da Vino	Scafoideo	Maltodestrina	Inserire
Vite da Vino	Cicaline	Cyantraniliprole	Inserire Note: -Consentito ogni 3 anni -Tra cyantraniliprole e clorantraniliprole al massimo 2 interventi all'anno N.interventi Clorantraniliprole=1
Vite da Vino	Tignoletta	Cyantraniliprole	Eliminare nota "2 applicazioni in tre anni"
Vite da Vino	Tignoletta	Cyantraniliprole	Inserire nota "1 applicazione in tre anni"
Vite da Vino	Tignoletta	Cyantraniliprole	Inserire nota "Tra cyantraniliprole e clorantraniliprole al massimo 2 interventi all'anno"
Vite da Vino	Tignoletta	Cyantraniliprole	Aumentare al 2 il numero degli interventi tra cyantraniliprole e clorantraniliprole
Vite da Vino	Tignola rigata	Clorantraniliprole	Inserire Nota: Tra clorantraniliprole e cyantraniliprole al massimo 2 interventi all'anno
Zucca	Nematodi	Paecilomyces lilacinus	Sostituire con: Paecilomyces lilacinus=Purpureocillium lilacinum"
Zucca	Ragnetto	Olio essenziale di arancio dolce	inserire
Zucca	Nematode galligeno	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Sostituire con: <i>Paecilomyces lilacinus=Purpureocillium lilacinum"</i>
Zucchino	Antracnosi	Prodotti rameici	Inserire Nota:Non superare l'applicazione

Allegato I

			cumulativa di 28 kg di rame/ ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Zucchini	Cladosporiosi	Prodotti rameici	Inserire Nota: Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame/ ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Zucchini	Ragnetto rosso	Olio essenziale di arancio dolce	Inserire
DISERBO			
Agrumi	Epoca: post-emergenza Infestanti: dicotiledoni	Florasulam	Inserire
Asparago		Metribuzin	Eliminare
Avena Segale Triticale	Epoca pre semina e pre emergenza Infestanti dicotiledoni	Pyraflufen-ethyl	Inserire
Barbabietola da zucchero in post emergenza	Dicotiledoni	Florpyrauxifen-benzyl	Inserire
Carota		Metribuzin	Eliminare
Cece		Metribuzin	Eliminare
Drupacee	Epoca fogliare post-emergenza	Flazasulfuron	Inserire Nota al massimo 1 intervento all'anno
Fava		Metribuzin	Eliminare
Favino		Metribuzin	Eliminare
Finocchio		Metribuzin	Eliminare
Fumento orzo	Epoca pre semina e pre emergenza Infestanti dicotiledoni	Pyraflufen-ethyl	Inserire
Girasole	Epoca pre semina e pre emergenza Infestanti dicotiledoni	Pyraflufen-ethyl	Inserire
Mais	Epoca pre semina e pre emergenza Infestanti dicotiledoni	Pyraflufen-ethyl	Inserire
Mais	Epoca pre-emergenza	Florasulam	Inserire
Nocciolo	Epoca fogliare post-emergenza	Flazasulfuron	Inserire Nota al massimo 1 intervento all'anno
Pisello		Metribuzin	Eliminare
Pomacee	Epoca fogliare post-emergenza	Flazasulfuron	Inserire Nota al massimo 1 intervento all'anno
Pomodoro in pieno campo		Metribuzin	Eliminare
Pomodoro in pieno campo	Epoca: post raccolta Infestanti: dicotiledoni	Pyraflufen-ethyl	Inserire

Allegato I

			Nota: tra raccolta della prima coltura e l'inizio della seconda N.interventi= 1
Prezzemolo	Epoca pre trapianto e post trapianto Infestanti graminacee e dicotiledoni	Pendimetalin	Inserire
Prezzemolo	Epoca pre trapianto e post trapianto Infestanti graminacee e dicotiledoni	Clomazone	Inserire
Soia		Metribuzin	Eliminare
Soia	Epoca pre semina e pre emergenza Infestanti dicotiledoni	Pyraflufen-ethyl	Inserire
Sorgo	Epoca pre semina e pre emergenza Infestanti dicotiledoni	Pyraflufen-ethyl	Inserire